


膵臓がん

# 治療適応

- ・手術で完全に治らない。
- ・他の臓器に大きな障害がない。
- ・日常の50%以上をベッドの外で生活している。

# 化学療法の 選択方法



- ・歩行可能で、自分の身の回りのことや軽い家事や事務仕事ならできる
- ・若年

UGT1A1遺伝子

その他

FOLFIRINOX


ホモまたはダブルヘテロ接合体

GEM+nab-PTX

# OLFIRINOX ( フォルフィリノックス ) (1サイクル 14日間)

4種類の抗がん剤を  
点滴で投与します。

- グラニセトロン 1mg/50ml (制吐剤)
- L-OHP 85mg/m<sup>2</sup>
- I-LV 200mg/m<sup>2</sup>
- CPT-11 180mg/m<sup>2</sup>
- 5-FU 2400mg/m<sup>2</sup> 持続静注



# GEM+nab-PTX(ゲムシタビン+ナブパクリタキセル) (1サイクル 28日間)

1種類の抗がん剤を  
点滴で投与します。

グラニセトロン 1mg/50ml  
(制吐剤)

30分



30分



30分



4週間を1サイクル。  
Day1、8、15に投与。

GEM 1000mg/m<sup>2</sup>

30分



30分



30分



nab-PTX 125mg/m<sup>2</sup>

30分



30分



30分



休薬

1コース

1日目

採血

8日目

採血


15日目

採血

22日目

採血

28日目



# GEM単剤(1サイクル 28日間)

1種類の抗がん剤を  
点滴で投与します。

グラニセトロン 1mg/50ml  
(制吐剤)

30分  
↓

30分  
↓

30分  
↓

4週間を1サイクル。  
Day1、8、15に投与。

GEM 1000mg/m<sup>2</sup>

30分  
↓

30分  
↓

30分  
↓

休薬

1コース

1日目

8日目

15日目

22日目

28日目

採血


採血

採血

採血


# TS-1単独療法（1サイクル42日間）

1種類の抗がん剤を  
内服します。







# FOLFIRINOXの副作用の発現時期




# GEM+nab-PTXの副作用の発現時期



# GEMの副作用の発現時期



# TS-1の副作用の発現時期



# 来院すべき症状



- 38.0℃以上の発熱、風邪症状が悪化する。
- 嘔吐が続き、食事や水分が丸1日以上全く摂れない。
- 1日に5回以上の下痢がある。
- 激しい頭痛、身体の痛みがある。
- 鼻や口からの出血が止まらない。

これらの症状が出た場合、または判断に困る症状が出た場合は  
すぐに病院に連絡してください。

- 平日8:30～11:30 は再来受付後、内科外来の窓口で症状をお伝えください。
- 平日11:30～17:00 は内科外来へ電話連絡してください。
- 休日・夜間は、病院へ電話連絡し受診希望であることを伝えてください。

町田市民病院 TEL:042-722-2230